

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP21-6-68793725

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT, HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE) (Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée  
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne  
Rue St-Jean prolongée - BALMA  
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément n° 1 au Bulletin n° 93 -

1968 - 13

### - AVERTISSEMENTS -

#### VIGNE

- Mildiou : A l'occasion des pluies orageuses du début du mois, des repiquages nombreux se sont produits dans et autour des foyers existants. De nouvelles taches vont apparaître à partir des 20 - 21 juin.

Quand le traitement qui devait être appliqué dans la semaine du 27 mai au 2 juin (communiqués radio des 23 et 25 mai) a pu être mis en place, la protection est très bonne sinon l'envahissement peut être localement déjà sérieux.

En raison de l'instabilité actuelle du temps et de la grande sensibilité de la vigne au voisinage de la floraison, il est nécessaire d'être très vigilant et d'appliquer sans attendre un nouveau traitement général.

Dans les foyers, ne pas hésiter à renouveler l'application cinq à six jours après si le temps perturbé persiste.

- Black-rot : Dans les foyers, de nouvelles taches plus nombreuses apparaissent depuis quelques jours. Les sorties vont se poursuivre, presque journellement, pendant un certain temps. Le traitement conseillé contre le mildiou agira contre le black-rot.

#### ARBRES FRUITIERS

- Carpocapse ou vers des pommes et des poires : Nous rappelons que si des pluies importantes (25 mm environ) se produisent après qu'un traitement ait été effectué, il est nécessaire de le renouveler sans attendre un autre bulletin.

### - INFORMATIONS -

- Anthracnose du cerisier : Sur les arbres dont la récolte est terminée, on pourrait réaliser actuellement un traitement en employant l'un des produits suivants :
  - Doguadine (90 g/hl),
  - Phaltane (100 g/hl),
  - ou Manèbe (160 g/hl).

P. 155

CULTURES LEGUMIERES

• Pomme de terre - Mildiou -

Tous départements y compris l'Aveyron

Le temps demeurant favorable à la maladie, il est recommandé d'appliquer en toutes régions et sur toutes les cultures un traitement soigné dès réception.

Etendre ce traitement aux cultures de Tomates.

• Melon - Cladosporiose et Anthracnose :

Les conditions climatiques actuelles sont favorables à ces maladies. Si le traitement conseillé dans le précédent bulletin n'a pu être mis en place, le réaliser dès réception.

- Oignon : On assiste depuis quelque temps à un développement important de mildiou. Le feuillage prend une teinte terne et quand on le regarde <sup>de près</sup> on peut observer un fin duvet grisâtre constitué par les fructifications du champignon.

Des traitements avec un produit à base de manèbe sont susceptibles de retarder l'envahissement des cultures.

BALMA, le 18 juin 1968

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux

L. IMBERT